



"Find Your Roots for the Future"

2026 ÜRÜN KATALOĞU NEOREVTARIM



GELECEK İÇİN KÖKLERİNİ BUL

İÇİNDEKİLER

Biostimulantlar

3-5

Fertigen Amino
Fertigen Marine
Fertigen Terra

Meso ve Mikro Elementler

6-7

NEO FER 6.0 IRON (4,8 Orto-orto)
NEO COMBI MIX

Özel Ürünler

8-10

Fertigen K
Fertigen Fruit
Fertigen ZnB

Bodur Zeytin ve Badem Fidanları

11

Zeytin (Arbequina, Arbosana, Lecciana, Coriana, Koroneiki, Oliana)
Badem (Makako, Avijor Laurene)



Fertigen AMINO

Bitkisel Menşeli Aminoasit

Garanti Edilen İçerik	W/V
Organik Madde	35%
Organik Karbon	13%
Organik Azot	2%
Potasyum Oksit (K ₂ O)	2%
Serbest Amino Asit	11%
pH	4-6



Fertigen Amino tamamen organik yapıda ve bitkisel kaynaklardan elde edilmiş aminoasit, vitamin ve enzimlerce zenginleştirilmiş enzimatik hidroliz yöntemiyle üretilmiş L-Aminoasitler içeren organik kökenli bir anti stres ürünüdür.

Fertigen Amino tozlaşmayı hızlandırır fotosentez hızını artırır negatif aksamı geliştirir.

Fertigen Amino zengin içeriği sayesinde hücre bölünmesini artırır, klorofil sentezi sayesinde fotosentezi hızlandırır ve verim artışı sağlar.

Olumsuz hava şartlarından kaynaklanan stres koşullarını ortadan kaldırır. Bitki metabolizmasını uyararak 19 temel L-aminoasitler içerir. İçeriğindeki yüksek oranda organik azot ve serbest aminoasitler sayesinde bitki tarafından alımı son derece hızlıdır.

Fertigen Amino o zengin içeriği sayesinde tüm yetiştirme dönemlerinde rahatça kullanılacak bir üründür.

KULLANIM DOZLARI

ÜRÜN	UYGULAMA ZAMANI	YAPRAKTAN DOZ* (g/hl)	FERTİGASYON DOZU* (kg/dekar)
 Tarla Bitkileri (Pamuk, Buğday, Tütün, Pirinç, Soya, Ayçiçeği, Fıstık, Arpa, Mercimek, Şeker Pancarı, Patates, Soğan, Havuç, Turp)	Üretim süresi boyunca 15-20 gün ara ile 2-3 uygulama tavsiye edilir.	100-150 ml/da	1 lt/da
 Sebzeler (Domates, Biber, Patlıcan, Marul, Salatalık, Çilek, Fasulye, Kavun, Karpuz, Kabak, Sarımsak, Lahana, Ispanak, Enginar, Kamabahar)	Üretim döneminde ihtiyaç duyulan dönemlerde 15-20 gün aralıklarla yaprakdan ve damla sulama ile verilir.	100-150 ml/da	1 lt/da
 Meyve Ağaçları (Narenciye, Elma, Armut, Kiraz, Ceviz, Bağ, Zeytin, Nar, Fındık, Kayısı, Şeftali, Kivi)	Gözler uyanmadan önce, Meyve oluşumunda ve Meyve büyüme döneminde olmak üzere toplam 3 uygulama tavsiye edilir.	100-125 ml/100 lt su	1 lt/da

Fertigen MARINE

Sıvı Deniz Yosunu

Garanti Edilen İçerik

Organik Madde	20%
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K ₂ O)	2%
Alginiik Asit	0,5%
Max. EC	16,11 (dS/m)
pH	6-8

Method of use



Foliar fertilization



Fertigation



Fertigen Marine, bitkilerin kök gelişimini destekleyen, stres koşullarına karşı dayanıklılığını artıran ve verim kalitesini yükselten doğal deniz yosunu ekstraktı sıvı organik gübredir.

Fertigen Marine, içeriğindeki organik madde sayesinde, toprak yapısını iyileştirir ve besin alımını kolaylaştırır.

Alginiik asit, kök hücre çoğalmasını ve saçak kök oluşumunu teşvik ederken, suda çözünür potasyum oksit (K₂O) meyve tutumu, dolumu ve kalite parametrelerinin iyileşmesine katkı sağlar.

Potasyum aynı zamanda meyve olgunlaşmasını hızlandırarak renk, aroma ve raf ömrünü geliştirir.

Fertigen Marine, düzenli kullanımda bitkilerin abiotik stres koşullarına (kuraklık, tuzluluk, sıcaklık farkı vb.) karşı dayanıklılığı artar ve verim sürekliliği sağlanır.

KULLANIM DOZLARI

ÜRÜN	UYGULAMA ZAMANI	YAPRAKTAN DOZ* (g/ha)	FERTİGASYON DOZU* (kg/dekar)
SEBZELER (SERA VE AÇIK ALAN)			
Domates, Biber, Patlıcan, Hıyar, Kavun, Karpuz, Kabak, Fasulye, Bezelye	Ekim/Dikim tarihinden 2 hafta sonra başlayıp sezon boyu 15-20 gün aralıklarla 3 uygulama yapılır	100 ml/100 lt su	500-750 ml/da
Marul, Ispanak, Lahana, Maydanoz, Karnabur	Ekim/Dikim tarihinden 2 hafta sonra başlayıp sezon boyu 15-20 gün aralıklarla 3 uygulama yapılır	100 ml/100 lt su	500-750 ml/da
Patates, Havuç, Soğan Sarımsak	Ekim/Dikim tarihinden 2 hafta sonra başlayıp sezon boyu 15-20 gün aralıklarla 3 uygulama yapılır	125 ml/100 lt su	500-750 ml/da
MEYVELER			
Narenciye; Portakal, Limon, Greyfurt, Mandalina vb., Elma, Armut, Kayısı, Şeftali, Erik, Kiraz, Nar	Çiçek öncesinden başlayarak 15-20 gün aralıklarla 3 uygulama yapılır.	150 ml/100 lt su	500-750 ml/da
Bağ, Çilek, Muz	Çiçek öncesinden başlayarak 15-20 gün aralıklarla 3 uygulama yapılır.	150 ml/100 lt su	500-750 ml/da
ENDÜSTRİ BİTKİLERİ			
Pamuk, Soya Fasulyesi, Yer Fıstığı, Mısır, Mercimek, Ayçiçeği, Nohut	İlk yaprakların oluşumundan itibaren 15-20 gün aralıklarla 3 uygulama yapılır	150 ml/100 lt su	500-750 ml/da
Tütün, Çay, Fındık	İlk yaprakların oluşumundan itibaren 15-20 gün aralıklarla 3 uygulama yapılır	150 ml/100 lt su	500-750 ml/da
Zeytin, Antepfıstığı, Badem	İlk yaprakların oluşumundan itibaren 15-20 gün aralıklarla 3 uygulama yapılır	150 ml/100 lt su	500-750 ml/da
Kesme Çiçekçilik	İlk yaprakların oluşumundan itibaren 15-20 gün aralıklarla 3 uygulama yapılır	100 ml/100 lt su	500-750 ml/da
HUBUBAT			
Buğday, Arpa, Çeltik, Yulaf	İlk bahar vejetasyon döneminden itibaren başlayarak 15-20 gün aralıklarla 2-3 uygulama yapılır.	100 ml/100 lt su	-

Fertigen Terra

Köklendirici

Garanti Edilen İçerik

Organik Madde	35%
Organik Karbon	15%
Toplam Azot	2%
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K ₂ O)	4%
pH	4-6

W/V



Method of use



Foliar fertilization



Fertigation

Fertigen Terra, bitkilerde kök gelişimini teşvik eden ve besin alım etkinliğini artıran biyoteknik bir üründür.

Fertigen Terra, içeriğindeki bileşikler sayesinde kök meristem bölgelerinde hücre bölünmesini uyatarak yeni saçak köklerin ve yan köklerin oluşumunu hızlandırır. Artan kök yüzeyi sayesinde makro ve mikro elementlerin topraktan alımı kolaylaşır, bitki daha dengeli beslenir.

Fertigen Terra, Kök-gövde oranını optimize ederek bitkinin su dengesini, fotosentetik aktivitesini ve genel büyüme performansını iyileştirir.

Fertigen Terra, damla sulama, yapraktan uygulama veya fide daldırma yöntemiyle kullanılabilir. Özellikle yeni dikim, çiçeklenme öncesi ve stres sonrası dönemlerde uygulanması en yüksek etkiyi sağlar.

KULLANIM DOZLARI

ÜRÜN	UYGULAMA ZAMANI	FERTİGASYON DOZU* (kg/dekar)
Sera Sebzeciliği (Domates, Biber, Patlıcan, Fasulye, Bezelye, Kabakgiller)	Ekim/Dikim'de can suyu ile verilir. İhtiyaç durumuna göre 15-20 gün arayla 2-3 uygulama yapılır.	100-200 ml/da
Açık alan Sebzeciliği (Domates, Biber, Patlıcan, Hıyar, Fasulye, Bezelye, Kabakgiller)	Ekim/Dikim'de can suyu ile verilir. İhtiyaç durumuna göre 15-20 gün arayla 2-3 uygulama yapılır.	100-200 ml/da
Çilek	Dikim'de can suyu ile verilir. İhtiyaç durumuna göre 15-20 gün arayla 2-3 uygulama yapılır.	100-200 ml/da
Meyve Ağaçları (Elma, Armut, Narenciye, Asma, Kiraz, Ceviz, Bağ, Zeytin, Nar, Fındık, Kayısı, Şeftali, Kivi)	İlk baharda gözlerin uyanmasından sonra kullanımına başlanıp 15-20 gün arayla 3 uygulama yapılır.	100-200 ml/da
Endüstri Bitkileri (Patates, Pancar, Soğan, Turp, Havuç)	İlk gerçek yaprakların oluşumundan itibaren 15-20 gün aralıklarla 3 uygulama yapılır	100-200 ml/da
Tarla Bitkileri ve Hububat (Mısır, Çeltik, Ayçiçeği, Pamuk, Soya Fasulyesi, Kuru Fasulye, Buğday, Arpa, Mercimek)	İlk gerçek yaprakların oluşumundan itibaren 15-20 gün aralıklarla 3 uygulama yapılır	100-200 ml/da
Fidelikler ve Kesme Çiçekçilikte	Ekim/Dikim'de can suyu ile verilir. İhtiyaç durumuna göre 15-20 gün arayla 2-3 uygulama yapılır.	100-200 ml/da

NEOFER IRON

EDDHA Şelatlı İTHAL Demir

Garanti Edilen İçerik

Demir (Fe) EDDHA
orto-orto

W/V

%6
4.8

Method of use



Pre-sowing
fertilization



Fertigation



pH(1% sol.) 7-9
Insoluble ≤ 0.1%

NEOFER IRON, Fe-EDDHA bazlı özel formülasyonu sayesinde bitkiye hem hızlı hem de uzun süreli demir temini sağlayan bir üründür.

Formülasyonunda %4,8 orto-orto demir oranı ile optimum etki sunar:

- Orto-Orto Fraksiyonu (%4,8): 6 kimyasal bağ sayesinde demir iyonunu uzun süre kararlı ve çözünür halde tutar. Bu da kalıcı ve güçlü bir etkis sağlar.

NEOFER IRON, tüm toprak tiplerinde kullanılabilir. Özellikle yüksek pH değerine ve aktif kireç fazlalığına sahip topraklarda etkili bir çözümdür.

KULLANIM DOZLARI

BİTKİ	KULLANIM ŞEKLİ / DÖNEMİ	TOPLAM DOZ
Narenciye	Hızlı büyüme dönemi İlkbahar gübrelemesi Sonbahar gübrelemesi	Ağaç başına 5-30g Ağaç başına 30-80g
Meyve Ağacı	Hızlı büyüme dönemi Vejetatif büyüme evresi (Trophophase)	Ağaç başına 5-20g Ağaç başına 20-50g
Asma	Tomurcuklar açılmadan önce Erken demir eksikliği belirtilerinde	Ağaç başına 3-5g Ağaç başına 5-25g

NEOCOMBI MIX

EDTA Şelatlı İTHAL Combi

Garanti Edilen İçerik	W/V
Demir (Fe)	4%
Mangan (Mn)	4%
Magnezyum (Mg)	3,3%
Bakır (Cu)	1,5%
Çinko (Zn)	1,5%
Bor (B)	0,5%
Molibden (Mo)	0,1%
Kobalt (Co)	0,05%



pH(1% sol.) 6±1.5

- NEOCOMBI** Bitki gelişiminde kritik rol oynayan tüm mikro elementleri aynı anda sağlar.
- Bitkinin kök, gövde, yaprak, çiçek ve meyve gelişiminde dengeli beslenmesini sağlar.
- Demir, mangan ve magnezyum birlikte çalışarak klorofil sentezini ve fotosentez verimliliğini artırır. Bu da daha yeşil, sağlıklı ve güçlü bitkiler anlamına gelir.
- Bor, çinko ve bakırın kombinasyonu, polen canlılığını artırır, çiçek dökülmesini azaltır ve meyve tutum oranını yükseltir. Özellikle verim kaybını önlemek için çiçeklenme döneminde çok faydalıdır.
- Molibden ve kobalt, azot metabolizmasını düzenler, kök bölgesindeki yararlı bakterileri destekler. Bu sayede bitki azotu daha etkin kullanır, kökler güçlenir.
- Kombine mikro element desteği, bitkiyi kuraklık, tuzluluk, aşırı sıcak/soğuk ve hastalık gibi stres koşullarına karşı daha dayanıklı hale getirir.
- EDTA şelatı sayesinde, pH'ı yüksek veya kireçli topraklarda bile mikro elementler çözünür ve bitki tarafından alınabilir. Böylece toprak kaynaklı mikro besin noksanlıklarını önler.
- Denge sağlandığında meyve ve sebzelerde renk, aroma, sertlik ve depolama süresi iyileşir. Özellikle ihracata giden ürünlerde kaliteyi artırır.

KULLANIM AMACI VE DOZLARI

Ürün Grubu	Uygulama Zamanı	Yaprak Uygulaması Doz (kg/ha)	Toprak Uygulaması Doz (kg/ha)
 Meyveler Turunçgil, Elma, Üzüm	Erken büyüme veya çiçeklenme dönemi	100 gr/100 lt su	200-1000 g/da
 Sebzeler Domates, Patates, Ispanak Havuç, Soğan, Brokoli	Vejetatif büyüme döneminde Dikimde veya erken büyüme döneminde	100 gr/100 lt su	300-800 g/da

Mikro Besin	Meyveler	Amaç
Demir (Fe)	Turunçgiller, Üzüm, Elma, Mango	Demir eksikliğini (kloroz) düzeltir; meyve kalitesini iyileştirir.
Çinko (Zn)	Turunçgiller, Muz, Armut, Şeftali	Çiçeklenmeyi, meyve tutumunu ve büyümeyi teşvik eder.
Mangan (Mn)	Ananas, Avokado, Yaban Mersini	Fotosentezi artırır ve yaprakların sararmasını önler.
Bakır (Cu)	Elma, Kiraz, Meyveler (Çilekçiller)	Meyve gelişimini ve hastalık direncini destekler.
Kalsiyum (Ca)	Elma, Üzüm, Çilek	Acı çukur gibi bozuklukları önler ve sertliği artırır.
Magnezyum (Mg)	Portakal, Limon, Misket Limonu	Klorofil üretimini ve genel meyve sağlığını artırır.

Fertigen K

Sıvı Potasyum Çözeltisi

Garanti Edilen İçerik

Potasyum Oksit (K₂O)

PH

W/V

27%

6,9

Method of use



Foliar fertilization



Fertigation



Fertigen K, tamamen organik ve bitkisel maddelerden üretilmiş özel bir potasyum kaynağıdır. Özellikle sebzelerdeki küçük meyve gelişmesini ve kalite anormallliğini gidermek için geliştirilmiştir.

Fertigen K, seralarda, tarla sebzeciliğinde, meyve yetiştiriciliğinde ve kesme çiçekçilikte kullanılabilir. Bu ürünün üretiminde özel organik şelatlar ilave edildiği için, bitkilerde hem yapraktan hem de topraktan son derece hızlı alınabilmektedir.

Fertigen K, meyvelerin hasattan sonra depolama ömrünü uzatmaktadır.

Fertigen K, uygulandığı ürünlerde etkisini hızla gösterir; özellikle kalite faktörü üzerindeki olumlu etkisi, hasat sonrası ticari olarak da üreticilerimize katkı sağlamaktadır.

KULLANIM DOZLARI

ÜRÜN	UYGULAMA ZAMANI	YAPRAKTAN DOZ* (g/hl)	FERTİGASYON DOZU* (kg/dekar)
 Açık tarla sebze yetiştiriciliği (Domates, Biber, Patlıcan, Salatalık, Kavun, Karpuz Fasulye, Bezelye)	İlk meyvelerin görülmeye başladığı tarihten itibaren 10-15 gün ara ile 2-3 uygulama tavsiye edilir.	200-250 ml/da	1,5-2 lt/da
 Meyve Ağaçları (Bağ, Turunçgiller, Elma, Armut, Kiraz, Ceviz, Zeytin, Nar, Fındık, Kayısı, Şeftali, Kivi)	İlk meyvelerin görülmeye başladığı tarihten itibaren 10-15 gün ara ile 2-3 uygulama tavsiye edilir.	250-300 ml/100 lt su	1,5-2 lt/da
 Çilek	İlk meyvelerin görülmeye başladığı tarihten itibaren 10-15 gün ara ile 2-3 uygulama tavsiye edilir.	200-250 ml/da	1,5-2 lt/da
 Tarla Bitkileri (Pamuk, Buğday, Tütün, Pirinç, Soya, Ayçiçeği, Fıstık, Arpa, Mercimek, Şeker Pancarı, Patates, Soğan, Havuç, Turp)	Ekimden 25-30 gün sonra başlayıp Üretim periyodu boyunca 10-15 gün ara ile 2-3 uygulama tavsiye edilir.	200 ml/da	1,5-2 lt/da

Fertigen FRUIT

Meyve Rengi ve Sertliği için Üstün Performans

Garanti Edilen İçerik

Garanti Edilen İçerik	W/V
Toplam Azot	10%
Amonyum Azotu	1%
Nitrat Azotu	9%
Fosfor Pentaoksit (P ₂ O ₅)	8%
Potasyum Oksit (K ₂ O)	18%
Kalsiyum Oksit (CaO)	8%
Bor (B)	1%

Method of use



Foliar fertilization



Fertigation



Fertigen Fruit, özellikle meyve tutumu, gelişimi ve kalitesini artırmak amacıyla geliştirilmiş, dengeli ve güçlü bir toz gübredir. İçeriğinde bulunan azot, fosfor, potasyum, kalsiyum ve bor gibi temel besin elementleri sayesinde bitkinin hem vegetatif hem de generatif gelişimini destekler.

Yüksek oranda nitrat formunda azot, bitkiler tarafından hızlı bir şekilde alınarak büyümeyi teşvik ederken, fosfor kök gelişimini ve çiçeklenmeyi destekler. Formülasyonun öne çıkan bileşeni olan potasyum, meyve iriliği, renklenme ve tat gibi kalite kriterlerini doğrudan etkiler. Kalsiyum, meyve dokusunu güçlendirerek çatlama ve çürüklere karşı koruma sağlar; bor ise çiçeklenme kalitesini artırarak sağlıklı meyve oluşumunu destekler.

Fertigen Fruit, meyve ve sebze üretiminde yüksek verim hedefleyen üreticiler için ideal bir tercihtir. Uygulama sonrası bitkide daha güçlü gelişim, daha yüksek meyve tutumu ve raf ömrü uzun, kaliteli ürünler elde edilir.

KULLANIM DOZLARI

ÜRÜN	UYGULAMA ZAMANI	YAPRAKTAN DOZ* (g/hl)	FERTİGASYON DOZU* (kg/dekar)
 Tüm Sebzeler	Ekim-Dikimden 15-20 gün sonra başlayıp 10-15 gün ara ile 2-3 uygulama tavsiye edilir.	100-150 gr/da	1 kg/da
 Tüm Meyve Ağaçları	Çiçek sonrasında itibaren 10-15 gün ara ile 2-3 uygulama tavsiye edilir.	150-200 gr/da	1 kg/da
 Tarla Bitkileri (Pamuk, Buğday, Tütün, Pirinç, Soya, Ayçiçeği, Fıstık, Arpa, Mercimek, Şeker Pancarı, Patates, Soğan, Havuç, Turp)	Çiçek sonrasında itibaren 10-15 gün ara ile 2-3 uygulama tavsiye edilir.	200 gr/da	1,5-2 lt/da

Fertigen ZnB

Çiçek Sayısı ve Tutumu için Üstün Performans

Garanti Edilen İçerik	W/V
Bor (B)	3%
Mangan (Mn)	8%
Çinko (Zn)	10%



Fertigen ZnB, bitkilerin gelişiminde hayati rol oynayan çinko, mangan ve bor elementlerini dengeli oranlarda içeren özel bir mikro besin çözeltilisidir. Özellikle çiçeklenme, döllenme ve meyve tutumu süreçlerinde etkin rol oynayan bu üçlü, bitkinin verim ve kalite potansiyelini en üst düzeye çıkarmayı hedefler.

İçeriğindeki çinko, bitkide hormon sentezini ve hücre bölünmesini destekleyerek güçlü bir gelişim sağlar. Mangan, klorofil oluşumu ve fotosentez için gereklidir; yaprakların daha sağlıklı ve yeşil kalmasına katkı sağlar. Bor ise çiçeklenme kalitesini artırır, polen canlılığını korur ve meyve tutumunu olumlu yönde etkiler.

Fertigen ZnB, özellikle mikro element eksikliklerinin sık görüldüğü bölgelerde veya hassas dönemlerde kullanıldığında; daha sağlıklı bitkiler, daha güçlü çiçeklenme ve daha kaliteli meyveler elde edilmesine yardımcı olur.

KULLANIM DOZLARI

ÜRÜN	UYGULAMA ZAMANI	YAPRAKTAN DOZ* (g/ha)	FERTİGASYON DOZU* (kg/dekar)
 Açık Tarla Tüm Sebzeler	Çiçek öncesi ve Çiçekten hemen sonra olmak üzere 2 uygulama tavsiye edilir.	100-150 gr/da	350-400 gr/da
 Sera Tüm Sebzeler	Çiçek öncesi ve Çiçekten hemen sonra olmak üzere 2 uygulama tavsiye edilir.	100-150 gr/da	350-400 gr/da
 Tüm Meyve Ağaçları ve Bağlarda	Çiçek öncesi, Çiçekten hemen sonra ve Hasat sonrası olmak üzere 3 uygulama tavsiye edilir.	100-150 gr/100 lt su	450-600 gr/da
 Kesme Çiçekçilik ve Çim Alanlarında	İhtiyaç duyulan durumlarda 10-15 gün ara ile 2-3 uygulama tavsiye edilir.	100-150 gr/100 lt su	350-400 gr/da

BODUR ZEYTİN ve BADEM FİDANLARI



Zeytin - Arbequina



Zeytin - Arbosana



Zeytin - Lecciana



Zeytin - Coriana



Zeytin - Koroneiki



Zeytin - Oliana



Badem - Makako

ÖZELLİKLER

Bütün zeytin çeşitlerimiz yağlık olup, makineli hasat ve budamaya uygundur Aynı makineler ile Makako çeşidi bademleri de hasat edebilir ve budayabilirsiniz. Tüm dünyada baş gösteren işçilik problemi ve maliyetleri göz önünde bulundurulduğunda, bodur zeytin ve badem çeşitleri çok önemli bir avantaj sağlamaktadır.

Bodur çeşit tercih ettiğinizde sadece bir zeytin fidanı değil aynı zamanda yeni bir bahçe modeli ile tanışmış oluyorsunuz. Super High Density Model!

Bu modelde Neorev Tarım olarak uzman ekibimiz sizlere sürecin başından sonuna kadar destek olmaktadır. Karar aşamasından başlayarak sulama altyapısı, fidan tedariği, dikim şekli, dikimden sonraki ilaçlama-gübreleme-sulama düzeni gibi tüm alanlarda sizlere destek oluyoruz ve bu modeli beraber bahçenize adapte ediyoruz.



NEOREV TARIM GIDA İTHALAT İHRACAT VE SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

web: www.neorevturkey.com

e-mail: info@neorevtarim.com

İletişim: +90 539 311 3547 / +90 542 633 9921

Adres : Yeni Mah. 524.Sokak Salihoğlu Apt. No:4 A Kızıltepe/Mardin

GELECEK İÇİN KÖKLERİNİ BUL