



neorev



“Find Your Roots for the Future”



ÜRÜN KATALOĞU

İÇİNDEKİLER

Biostimulantlar

3-10

Crop Extra
CytoNutri NPK
Kamab 26
Ek-Lon Max
Magnisol
Skicc
Hendosar
Fertigen Amino

Meso ve Mikro Elementler

11-13

Sequifill 6.0 TSS
NEO FER 6.0 IRON (4,8 Orto-orto)
NEO COMBI MIX

Özel Ürünler

14-16

Fertigen K
Fertigen Fruit
Fertigen ZnB

Damlama Gübreleri

17-18

IDRON 9-50-9+ 2(MgO)+ M.E
IDRON 10-5-23 +8CaO+ 2 MgO+ M.E
IDRON 10-5-40+ 2 MgO+ M.E
IDRON 18-18-18+ M.E
K-SOL 9 50 9+ M.E
K-SOL 20-20-20+ M.E
K-SOL 12-6-36 +7 (SO₃) + M.E
K-SOL 10-50-0+ 5 MgO+ M.E

Granül Taban Gübreleri

19

N-GOOO N21 + 58SO₃
N-GOOO N30 + 36SO₃
N-GOOO 12-28
N-GOOO 15-5-25 + 9 SO₃
N-GOOO 14-6-16+ 31SO₃+ 2CaO+ 2 MgO+ 0,1 B

MikroGranül Taban Gübreleri

20

Microphos 8-33-10 + (2 MgO) + (9 SO₃) + (0,8 Zn) ME

Bodur Zeytin ve Badem Fidanları

21


Zeytin (Arbequina, Arbosana, Lecciana, Coriana, Koroneiki, Oliana
Badem (Makako)

Crop Extra

Stres Gidermede Üstün Performans


Garanti Edilen İçerik

Organik Madde	15%
Toplam Azot	6%
Fosfor Pentaoksit (P2O5)	4%
Potasyum Oksit (K2O)	4%
Organik Karbon	3%
Alginic Acid	0,5%



- Crop+ Extra biyotik ve abiyotik stres koşullarında olmak üzere vejetasyon döneminin başlangıcından, hasat öncesine kadar her dönemde kullanılabilir.
- Çok aşamalı fermentasyon teknolojisi kullanılan biyoteknolojik bir üründür. İçerisinde bulunan elisitörler nedeniyle sadece bir yaprak gübresi değil aynı zamanda bio-stimülant görevi de üstlenir.
- Kullanılan doğal şelatlar sayesinde elementlerin alınımı çok kısa sürede kolayca sağlanmaktadır.
- Düşük molekül ağırlığına sahip aminoasitler sayesinde elementlerin bitki içerisindeki translokasyonu (dolaşımı) kolay ve çabuk olmaktadır.
- Yaprak dokusundaki protein kaybını azaltarak kloroplastların asimilasyon etkinliğini yükseltir.
- Karbonhidrat, yağ ve protein sentezini artırır.
- Kök gelişimini artırarak topraktaki besinlerin alınımını kolaylaştırır verim ve kaliteyi yükseltir.

CROP+ İçeriği/Kompozisyonu



KULLANIM DOZLARI


ÜRÜN	YAPRAKTAN DOZ* (g/lt)	UYGULAMA SAYISI	UYGULAMA ZAMANI
Domates, biber, patlıcan, hıyar, karpuz, kavun vb.	100 ml/da	3	Çiçeklenme dönemi ve öncesi, çiçeklenme döneminde ve Meyve tutumunda
Enginar, lahan, karnabahar, marul, ıspanak, maydono, roka vb.	100 ml/da	2	6-8 yapraklı dönemde 15 gün sonra
Zeytin, Narenciye, Şeftali, Kiraz, Erik, Elma, Kayısı, Nar vb.)	150 ml / 100su	3	Çiçeklenme öncesi , Tam çiçek ve Meyve tutumu
Bağ	100 ml/100 lt suya	3	Sürgünler 20-25 cm olduğunda, çiçek esnasında yada çiçekten hemen sonra , meyve tutumundan sonra
Pamuk	100 ml/da	4	Çıkıştan sonra ,6-8 yapraklı olunca, çiçek döneminde koza döneminde
Yumrulu sebzeler (patates, soğan, sarımsak)	100 ml/da	4	Erken dönemde, çiçeklenme döneminde, meyve tutumunda ve 15 gün sonra
Şeker pancarı, havuç, kereviz vb.	100 ml/da	2	7-8 yapraklı dönem ve 15 gün sonra
Sert kabuklu meyveler (fındık, ceviz, kestane, antepfıstığı)	100 lt suya /150ml	3	Tomurcuklar kabardığında, meye tutumunda ve yirmi gün sonra
Hububat (buğday, çeltik, arpa vb)	125 ml/da	2	Kardeşlenme dönemi, Süt olum evresi
Mısır	125 ml/da	1	7-8 yapraklı dönemde
Soya	100 ml/da	2	Çiçek öncesi ve meyve tutumunda
Ayçiçeği	125 ml/da	1	Yıldız oluşumu
Yer fıstığı	100 ml/da	2	Çiçeklenme başlangıcı ve kapsül oluşumunda
Muz	150 ml / 100 lt suya	3	Hızlı gelişme döneminde ve meyve tutumunda ve 15 gün sonra
İncir	150 ml / 100 lt suya	2	Yapraklanma döneminde, iliklenme tamamlanınca
Baklagiller (fasulye, bezelye vb)	100 ml/da	2	8-9 yapraklı dönemde ve 15 gün sonra
Süs bitkileri	100 ml/da	3	Dikimden 20 gün sonra, çiçeklenme döneminde ve 20 gün sonra
Tütün	100 ml/da	2	Dikimden bir ay sonra ve 20 gün sonra
Çim	100 ml/da	2	İlkbahar gelişme döneminde ve 20 gün sonra

CytoNutri 3-14-14

NPK'LI Sıvı Organomineralli Gübre


Garanti Edilen İçerik

Toplam Azot (Üre)	3%
Fosfor Pentaoksit (P2O5)	14%
Potasyum Oksit (K2O)	14%



- CytoNutri ürünleri, Cytozyme'ın tescilli MAC teknolojisi ile elde edilen, yapraktan uygulama için sıvı konsantrelerdir.
- CytoNutri serisi, yüksek antioksidan aktivite sergileyerek bitkilerin patojenlere karşı direncinde ve ürün kalitesinde önemli bir rol oynar.
- Cytozyme'ın gelişmiş ve tescilli MAC teknolojisi, bitki performansını artırmak için metabolik olarak aktif bileşiklerin gücünü kullanır.
- Abiyotik strese karşı dayanımı artırır.
- Verim artışı sağlar.
- Kök gelişimini destekler.

CROP+ İçeriği/Kompozisyonu



KULLANIM DOZLARI

- Meyve ağaçlarında (elma, armut, şeftali, kayısı, erik, nar, fındık, vb.) 100 lt. suya 100-300 ml dozunda meyve oluşumunda ve Azot, fosfor, Potasyum eksikliklerinin görüldüğü durumlarda.
- Taneli ufak meyvelerde (Dut, Böğürtlen, Kiraz, Vişne, Çilek) Azot, fosfor, Potasyum eksiklikleri görüldüğünde 100 lt suya 100-300 ml.
- Bağda, çiçeklenme öncesinde 100 lt suya 100-300 ml., tarla bitkileri ve tüm sebzelerde çiçeklenme öncesi ve Azot, fosfor, Potasyum eksikliklerinin görüldüğünde dekara 100-300 ml.
- Yeşil alan ve kesme çiçekçilikte 100 lt suya 100-300 ml. tüm büyüme evreleri ve Azot, fosfor, Potasyum eksikliklerinin görüldüğünde uygulanır.

Kamab 26

Kalsiyum Magnezyum Dengeli Biostimulant



Garanti Edilen İçerik

	W/V
Toplam Azot	%10
Nitrat Azotu	%10
Potasyum Oksit (K ₂ O)	%5
Kalsiyum Oksit (CaO)	%10
Magnezyum Oksit (MgO)	%2
Bor (B)	%0,1

Meyve ve Sebzelerde Ürün Kalitesini Artıran Özel Biostimulant

- KAMAB-26, meyve, sebze, süs ve aromatik bitkilerde ürün kalitesini artırmak amacıyla geliştirilmiş, yüksek etkili bir biyoyararıdır.
- ADRIATICA tarafından geliştirilen ve firmaya özgü KK Teknolojisi ile üretilen bu özel formül, besin maddelerinin bitki tarafından daha hızlı ve etkin şekilde alınmasını sağlar.
- Bu teknoloji sayesinde KAMAB-26, özellikle kalsiyum, magnezyum ve potasyum dengesizliklerinin giderilmesinde son derece etkili bir çözümdür.
- Formülündeki bu üç temel elementin ideal oranı, bitkilerdeki beslenme bozukluklarını düzeltir ve meyve gelişimi üzerinde olumlu etkiler yaratır. Uygulamalar sonucunda meyve büyüklüğü, dokusu ve genel kalitesinde belirgin iyileşmeler gözlemlenir.
- KAMAB-26'nın meyve gelişiminin erken dönemlerinde uygulanması, kalsiyumun meyve içinde dengeli dağılmasını teşvik eder. Bu sayede meyve daha sağlam yapılı olur, mekanik zararlara karşı daha dirençli hale gelir ve hasat sonrası raf ömrü uzar.

KULLANIM DOZLARI

ÜRÜN	BESLENME BOZUKLUĞU	UYGULAMA ZAMANI	DOZ/DEKAR*
Üzüm	Sap nekrozu, üzüm tanesi dökülmesi	Koruyucu: Meyve tutumundan renk değişimine kadar 3-4 uygulama; gerekirse hasattan 10-15 gün önce veya predispozan koşullar oluştuğunda tekrarlayın. Tedavi edici: İlk belirtiler görüldüğünde; belirtiler kaybolana kadar her 7-10 günde bir tekrarlayın.	Koruyucu: 0.4 kg Tedavi edici: 0.6 kg
Yumuşak çekirdekli meyveler (Ayva, Elma, Armut)	Acı leke, hasat sonrası çürüme, yüzeysel kabuk yanığı	Meyve tutumundan meyve çapı 40 mm'ye kadar 10-12 gün aralıklarla 2-3 uygulama.	0.4-0.6 kg
Kivi	Meyve yumuşaması, raf ömrü	Çiçeklenmeden meyve çapı 40 mm'ye kadar 10-12 gün aralıklarla 3-4 uygulama.	0.4-0.6 kg
Sert çekirdekli meyveler (Kayısı, Kiraz, Nektarin, Şeftali, Erik)	İç et kahverengileşmesi, yüzeysel kabuk yanığı, raf ömrü	Meyve tutumundan renk değişimine kadar 2-3 uygulama.	0.4-0.6 kg
Çilek	Uç yanıklığı, kaliks nekrozu, raf ömrü	Meyve tutumundan itibaren 10-12 gün aralıklarla 2-3 uygulama.	0.4-0.6 kg
Avokado ve Mango	Çiçek dökülmesi, meyve dökülmesi	3-4 uygulama: çiçeklenme öncesi, çiçeklenme başlangıcı, tam çiçeklenme, meyveler son boyutun %10'una ulaştığında.	0.4-0.6 kg
Küçük meyveler (Ahududu, Yaban mersini, Böğürtlen, Frenk üzümü)	Meyve yumuşaması, raf ömrü	Çiçeklenme öncesinden itibaren 10-12 gün aralıklarla 3-4 uygulama.	0.4-0.6 kg
Meyveli sebzeler (Karpuz, Salatalık, Patlıcan, Kavun, Biber, Domates, Kabak, Balkabağı)	Uç çürüklüğü	Çiçeklenme öncesinden itibaren 10-15 gün aralıklarla 2-3 uygulama.	0.4-0.6 kg
Yapraklı sebzeler (Hindiba, Marul, Roka, Kivircik, Kereviz, Ispanak)	Uç yanıklığı	3 uygulama: 1. uygulama: Dikimden 7 gün sonra 2. uygulama: Öncekinden 7-10 gün sonra 3. uygulama: Hasattan 8 gün önce.	0.4-0.6 kg
Tüm ürünler	Meyve dokusu, raf ömrü, meyve çatlaması	Meyve tutumundan meyve çapı 40 mm'ye kadar 10-12 gün aralıklarla 2-3 uygulama.	0.4-0.6 kg
Tüm ürünler	Daha iyi çiçeklenme	Çiçeklenme öncesi 1-2 uygulama.	0.4-0.6 kg

Ek-Lon Max

Sıvı Deniz Yosunu (Ecklonia maxima)

Garanti Edilen İçerik

	W/V
Organik Madde	7%
Alginik Asit	0,8%
Potasyum Oksit (K ₂ O)	0,2%
Maximum EC (dS/m) (1%)	3%
pH	4,4



- eK-lon MAX, %100 doğal, kahverengi deniz yosunu Ecklonia maxima'nın yapraklarından elde edilen sıvı bir biostimulanttır. İçeriğinde yaklaşık %30 deniz yosunu özü (kuru madde karşılığı %3) bulunur ve düşük sıcaklıkta işlenerek tüm faydalı bileşenlerin korunması sağlanır.
- Ayrıca, bitkide büyümeyi destekleyen hormon dengesine (auksin-sitokinin oranı 10:1) sahiptir. Bu sayede kök gelişimi artar, besin alımı iyileşir ve fotosentez kapasitesi yükselir. Sonuç olarak verim artar.
- eK-lon MAX, organik tarımda kullanıma uygundur ve sürdürülebilir tarım için etkili, yenilikçi bir çözümdür.

Başlıca etkili maddeleri:

- Aljinik asit: Bitkinin su ve besin maddelerini daha iyi tutmasını sağlar, böylece su stresine karşı dayanıklılığı artırır.
- Fukoidanlar ve laminarinler: Bitkinin doğal savunma sistemini güçlendirir, çevresel streslere karşı direnci artırır.
- Betaine: Su dengesini düzenler ve bitki hücrelerini zarar görmekten korur.

KULLANIM DOZLARI

ÜRÜN	UYGULAMA ZAMANI	YAPRAKTAN DOZ* (g/hl)	FERTİGASYON DOZU* (kg/dekar)
Meyveli sebzeler (Karpuz, Salatalık, Patlıcan, Kavun, Biber, Domates, Kabak, Balkabağı)	Fide dönemi: Fidelere haftada bir, 2-3 kez uygulayın. Dikim öncesinde fide tepsilerini 1:100 çözeltiye batırın. Tarla dönemi: Dikimden 15 gün sonra başlayarak, 15 gün aralıklarla 2-4 uygulama.	200-300 g/hl	0.3-0.6 kg
Diğer sebzeler (Sarımsak, Brokoli, Havuç, Lahana, Karnabahar, Soğan, Rezene, Pırasa)	Fide dönemi: Fidelere haftada bir, 2-3 kez uygulayın. Dikim öncesinde fide tepsilerini 1:100 çözeltiye batırın. Tarla dönemi: Dikimden 15 gün sonra başlayarak, 15 gün aralıklarla 2-4 uygulama.	200-300 g/hl	0.3-0.6 kg
Yapraklı sebzeler (Hindiba, Marul, Roka, Kıvrıkcık, Kereviz, Ispanak)	Fide dönemi: Fidelere haftada bir, 2-3 kez uygulayın. Dikim öncesinde fide tepsilerini 1:100 çözeltiye batırın. Tarla dönemi: Dikimden 15 gün sonra başlayarak, 15 gün aralıklarla 2-4 uygulama.	200-300 g/hl	0.3-0.6 kg
Zeytin ve Üzüm	3 uygulama: 5-10 cm tomurcuklar, çiçeklenme öncesi, 4-6 mm çapında üzüm/erik.	300-400 g/hl	0.4-0.8 kg
Kivi	3-4 uygulama: Çiçeklenme öncesinden başlayarak, 15 gün aralıklarla tekrarlayın.	300-400 g/hl	0.4-0.8 kg
Turunçgiller (Portakal, Bergamot, Clementine, Limon, Mandalina)	3-4 uygulama: Çiçeklenme öncesinden başlayarak, 10-14 gün aralıklarla tekrarlayın.	300-400 g/hl	0.4-0.8 kg
Yumuşak çekirdekli meyveler (Ayva, Elma, Armut)	Çiçeklenme öncesi, taç yaprakların dökülmesi, meyve çapı 20 mm'den itibaren: 10-15 gün aralıklarla uygulama.	300-400 g/hl	0.4-0.8 kg
Sert çekirdekli meyveler (Kayısı, Kiraz, Nektarin, Şeftali, Erik)	4-6 uygulama: Çiçeklenmeden renk değişimine kadar, 15 gün aralıklarla.	300-400 g/hl	0.4-0.8 kg
Çilek	Dikim öncesinde fideleri 1:100 çözeltiye batırın. Çiçeklenme başlangıcından itibaren: 15-20 gün aralıklarla 2-3 uygulama.	300-400 g/hl	0.4-0.8 kg
Sert kabuklu meyveler	Dişi çiçeklenmesinden itibaren: 15 gün aralıklarla 3-5 uygulama.	300-400 g/hl	0.4-0.8 kg
Baklagiller (Fasulye, Mercimek, Bezelye)	4 uygulama: 3-5 yaprak, çiçeklenme öncesi, tam çiçeklenme ve bakla gelişimi döneminde.	200-300 g/hl	0.3-0.6 kg
Küçük meyveler (Ahududu, Yaban mersini, Böğürtlen, Frenk üzümü)	Çiçeklenme öncesinden başlayarak, 7-10 gün aralıklarla 3-4 uygulama.	200-300 g/hl	0.3-0.6 kg

Magnisol

Sıvı Azot İçerikli Biostimulant

Garanti Edilen İçerik

	W/V
Toplam Azot	%20
Üre Azotu	%20
Magnezyum Oksit (MgO)	%5
Sülfürik Anhidrit (SO ₃)	%10
Molibden (Mo)	%0,002
Çinko (Zn)	%0,1



- POLIFILL MAGNISOL N20 Mo Zn, endüstriyel bitkilerin ve tahılların verim performansını ve kalitesini iyileştirmek için azot, kükürt ve magnezyumu dengeli oranlarda bir araya getiren yaprak uygulamalarına yönelik bir gübredir.
- Bu elementler arasında mevcut olan özel orana bağlı belirgin plastik aktivite, ürünün niceliksel ve niteliksel veriminin belirlendiği fenolojik aşamalar sırasında bitkiyi destekler.
- Kükürt, nitrojenle sinerji içinde, yüksek enerjili protein bileşiklerinin oluşumunu destekleyerek üretim kalitesini artırır. Magnezyum, nitrojenle sinerji içinde, fotosentetik sürece aktif olarak katılır ve yaprağın işlevselliğini korumak, dolayısıyla bitkinin üretkenlik özelliklerini geliştirmek için gereklidir.
- Şaraplık üzümlerde geç büyüme dönemlerinde (ben düşme döneminden başlayarak) uygulanan POLIFILL MAGNISOL N20 Mo Zn, dengeli besin içeriği sayesinde, Kolay Asimile Edilebilir Azot (APA) ve şıraların asitliği ve aromasının artırılmasında etkilidir.

KULLANIM DOZLARI

ÜRÜN	UYGULAMA ZAMANI	DOZ/DEKAR*
Şaraplık Üzüm	Renk değişiminden itibaren 10-15 günde bir 2 uygulama	2,5 kg
Tahıllar (Yulaf, Buğday, Mısır, Arpa, Pirinç, Çavdar, Darı, Triticale)	Çıkış sonrası herbisit ve bitki sağlığı uygulamaları ile birlikte	2,5 kg
Endüstri Bitkileri (Şeker pancarı, Şeker kamışı, Kolza (kanola), Pamuk, Ayçiçeği, Sanayi tipi domates, Soya, Tütün)	Çıkış sonrası herbisit ve bitki sağlığı uygulamaları ile birlikte	2,5 kg

SKICC

Endüstriyel Bitkilerin Dostu

Garanti Edilen İçerik

	W/V
Toplam Azot	%9
Nitrat Azotu	%9
Potasyum Oksit (K ₂ O)	%6
Kalsiyum Oksit (CaO)	%10
Bor (B)	%0,1



- SKICC, klorofil biyosentezini teşvik ederek fotosentez ve bitki metabolizmasını geliştirmek, böylece maksimum verime ulaşmak amacıyla özel olarak geliştirilmiş bir biostimulanttır.
- ADRIATICA, SKICC'i kendi geliştirdiği KK Teknolojisi ile üreterek, besin maddelerinin bitki tarafından daha hızlı ve verimli şekilde alınmasını sağlamıştır.
- Dengeli besin oranına sahip formülasyonu sayesinde, sadece klorofil sentezini artırmakla kalmaz; aynı zamanda besin alımını ve kullanım verimliliğini de optimize eder.
- Tüm bu özellikleriyle SKICC, ürün kalitesi ve verimi açısından yüksek performans sunar.

KULLANIM DOZLARI

ÜRÜN	UYGULAMA ZAMANI	DOZ/DEKAR*
Meyveli sebzeler (Karpuz, Salatalık, Patlıcan, Kavun, Biber, Domates, Kabak, Balkabağı)	Dikim sonrası, çiçeklenme öncesi, renk değişimi dönemi, bitki koruma uygulamaları ile birlikte	0.4-0.6 kg
Yapraklı sebzeler (Hindiba, Marul, Roka, Kivırcık, Kereviz, Ispanak)	Dikim sonrası ve vejetatif gelişim döneminde, bitki koruma uygulamaları ile birlikte	0.4-0.6 kg
Diğer sebzeler (Sanımsak, Brokoli, Lahana, Karnabahar, Soğan, Rezene, Pırasa)	Dikim sonrası ve vejetatif gelişim döneminde, bitki koruma uygulamaları ile birlikte	0.4-0.6 kg
Ayçiçeği ve Mısır	3-6 yaprak dönemi, çıkış sonrası herbisit uygulaması ile birlikte	0.6-0.8 kg
Tahıllar (Buğday, Arpa, Pirinç)	Sapa kalkma dönemi (çıkış sonrası herbisit ile), başaklanma öncesi (fungisit ile)	0.4-0.6 kg
Kanola	Çiçeklenme öncesi ve meyve tutumu dönemi, insektisit uygulaması ile birlikte	0.4-0.6 kg
Pancar	Yaprak gelişimi sırasında sıraların birleştiği dönem, çıkış sonrası herbisit uygulaması ile birlikte	0.6-0.8 kg
Şeker Kamışı	Dikim sonrası ve vejetatif gelişim döneminde, bitki koruma uygulamaları ile birlikte	0.6-0.8 kg
Soya	Vejetatif gelişim dönemi, çıkış sonrası herbisit uygulaması ile birlikte	0.6-0.8 kg
Sanayi Domatesi	Dikim sonrası, çiçeklenme öncesi, renk değişimi dönemi, bitki koruma uygulamaları ile birlikte	0.4-0.6 kg
Patates	Çiçeklenme öncesinden yumru oluşumuna kadar, fungisit uygulaması ile birlikte	0.4-0.6 kg
Pamuk	Çıkış sonrası ve çiçeklenme öncesi, çıkış sonrası/herbisit/fungisit uygulamaları ile birlikte	0.4-0.6 kg

HENDOSAR

Toprak Tuzluluk Giderici Biostimulant



Garanti Edilen İçerik

	W/V
Toplam Azot	%9
Nitrat Azotu	%9
Potasyum Oksit (K ₂ O)	%6
Kalsiyum Oksit (CaO)	%10
Magnezyum (MgO)	%2
Mangan (Mn)	%0,015
Çinko (Zn)	% 0,015

HENDOSAR, bitki ve tarla bitkilerinde aşırı tuzluluğun yol açtığı olumsuz etkileri önlemek ve gidermek üzere özel olarak geliştirilmiş bir biostimulandır.

Kök-Toprak Besin Matrisi Oluşturur

- Uygulama sonrasında HENDOSAR, kökler ve toprak partikülleriyle besince zengin bir ortam oluşturarak besin alımını kolaylaştırır. Bu sayede tüm bitkilerde ve her fenolojik evrede güvenle kullanılabilir.

Toprak Dokusu İçin Dengeli Kalsiyum-Magnezyum Oranı (4 : 6)

- Formülündeki Kalsiyum ve Magnezyum (4 : 6 oranında), killi toprak kolloidlerinde sodyum (Na) iyonlarının yerini alır. Fazla sodyum çözünerek yıkanır; böylece toprak yapısı iyileşir ve kök çevresindeki tuzluluk seviyesi düşer.

Tuzluluğa Karşı Dayanıklı Kök Bölgesi

- Yüksek tuzluluk koşullarında bile kökler besin alımına devam eder; bitkilerde büyüme durmaz ve fotosentez yeniden canlanır.

Verim ve Ürün Kalitesinde Güvence

- Besin dengesi hızla toparlandığı için, tuzluluk nedeniyle büyümesi durmuş bitkiler kısa sürede gelişmelerine devam eder. Sonuçta verim ve ürün kalitesi korunur.

HENDOSAR, tuzluluk stresiyle mücadelede etkili, toprağın fiziksel yapısını destekleyen ve tüm yetiştirme dönemlerinde güvenle uygulanabilen yenilikçi bir çözümdür.

KULLANIM DOZLARI

ÜRÜN	UYGULAMA ZAMANI	TOPRAKTAN DOZ/DEKAR
Tüm ürünler	Ekim-Dikim öncesi, Kumlu Topraklar: 2-3 Uygulama	2-4 kg
Tüm ürünler	Ekim-Dikim öncesi, Killi Topraklar: 2 Uygulama	2-4 kg

Fertigen AMINO

Bitkisel Menşeli Aminoasit

Garanti Edilen İçerik	W/V
Organik Madde	35%
Organik Karbon	13%
Organik Azot	2%
Potasyum Oksit (K ₂ O)	2%
Serbest Amino Asit	11%
pH	4-6

Method of use



Foliar fertilization



Fertigation



Fertigen Amino tamamen organik yapıda ve bitkisel kaynaklardan elde edilmiş aminoasit, vitamin ve enzimlerce zenginleştirilmiş enzimatik hidroliz yöntemiyle üretilmiş L-Aminoasitler içeren organik kökenli bir anti stres ürünüdür.

Fertigen Amino tozlaşmayı hızlandırır fotosentez hızını artırır negatif aksamı geliştirir.

Fertigen Amino zengin içeriği sayesinde hücre bölünmesini artırır, klorofil sentezi sayesinde fotosentezi hızlandırır ve verim artışı sağlar.

Olumsuz hava şartlarından kaynaklanan stres koşullarını ortadan kaldırır. Bitki metabolizmasını uyararak 19 temel L-aminoasitler içerir. İçeriğindeki yüksek oranda organik azot ve serbest aminoasitler sayesinde bitki tarafından alımı son derece hızlıdır.

Fertigen Amino o zengin içeriği sayesinde tüm yetiştirme dönemlerinde rahatça kullanılacak bir üründür.

KULLANIM DOZLARI

ÜRÜN	UYGULAMA ZAMANI	YAPRAKTAN DOZ* (g/hl)	FERTİGASYON DOZU* (kg/dekar)
 Tarla Bitkileri (Pamuk, Buğday, Tütün, Pirinç, Soya, Ayçiçeği, Fıstık, Arpa, Mercimek, Şeker Pancarı, Patates, Soğan, Havuç, Turp)	Üretim süresi boyunca 15-20 gün ara ile 2-3 uygulama tavsiye edilir.	100-150 ml/da	1 lt/da
 Sebzeler (Domates, Biber, Patlıcan, Marul, Salatalık, Çilek, Fasulye, Kavun, Karpuz, Kabak, Sarımsak, Lahana, Ispanak, Enginar, Kamabahar)	Üretim döneminde ihtiyaç duyulan dönemlerde 15-20 gün aralıklarla yapraklı ve damla sulama ile verilir.	100-150 ml/da	1 lt/da
 Meyve Ağaçları (Narenciye, Elma, Armut, Kiraz, Ceviz, Bağ, Zeytin, Nar, Fındık, Kayısı, Şeftali, Kivi)	Gözler uyanmadan önce, Meyve oluşumunda ve Meyve büyüme döneminde olmak üzere toplam 3 uygulama tavsiye edilir.	100-125 ml/100 lt su	1 lt/da

SEQUIFILL 6.0 TSS

EDDHA Şelatlı Demir

Garanti Edilen İçerik

ortho ortho EDDHA Şelat
ortho para EDDHA Şelat

W/V

%4
%2

Method of use



Pre-sowing
fertilization



Fertigation



SEQUIFILL 6.0 T SS, Fe-EDDHA bazlı özel formülasyonu sayesinde bitkiye hem hızlı hem de uzun süreli demir temini sağlayan bir üründür.

Formülasyonunda %4 orto-orto ve %2 orto-para bağlı demir oranı ile optimum etki sunar:

- Orto-Orto Fraksiyonu (%4): 6 kimyasal bağ sayesinde demir iyonunu uzun süre kararlı ve çözünür halde tutar. Bu da kalıcı ve güçlü bir etkisizler.
- Orto-Para Fraksiyonu (%2): 5 kimyasal bağ ile toprağa uygulandığında demir iyonunu hızla serbest bırakır, bitki tarafından hemen alınabilir hale getirir ve aynı zamanda toprakta stabil kalır.

SEQUIFILL 6.0 T SS, tüm toprak tiplerinde kullanılabilir. Özellikle yüksek pH değerine ve aktif kireç fazlalığına sahip topraklarda etkili bir çözümdür.

KULLANIM DOZLARI

ÜRÜN	UYGULAMA ZAMANI	DOZ/DEKAR*
Kivi ve Üzüm	Koruyucu ve bakım uygulamaları: tomurcuk gelişiminden meyve tutumuna kadar. Yaprak dökümü öncesi tekrarlanmalıdır	1-2 kg
Sert çekirdekli meyveler (Kayısı, Kiraz, Nektarin, Şeftali, Erik) ve Yumuşak çekirdekli meyveler (Ayva, Elma, Armut)	Koruyucu ve bakım uygulamaları: tomurcuk gelişiminden meyve tutumuna kadar. Yaprak dökümü öncesi tekrarlanmalıdır	1-2 kg
Turuncgiller (Portakal, Bergamot, Clementine, Limon, Mandalina) ve Zeytin	Koruyucu ve bakım uygulamaları: tomurcuk gelişiminden meyve tutumuna kadar. Yaprak dökümü öncesi tekrarlanmalıdır	1-2 kg
Meyveli sebzeler (Karpuz, Salatalık, Patlıcan, Kavun, Biber, Domates, Kabak, Balkabağı)	Koruyucu ve bakım uygulamaları: erken vejetatif dönemlerden itibaren	1-2 kg
Endüstriyel bitkiler (Pancar, Şeker kamışı, Kanola, Pamuk, Ayçiçeği, Sanayi domatesi, Soya, Tütün)	Koruyucu ve bakım uygulamaları: erken vejetatif dönemlerden itibaren	1-2 kg
Süs bitkileri (özellikle sardunya ve krizanem)	Koruyucu ve bakım uygulamaları: erken vejetatif dönemlerden itibaren	1-2 kg

NEO FER 6.0 IRON

EDDHA Şelatlı İTHAL Demir

Garanti Edilen İçerik

Demir (Fe) EDDHA
orto-orto

W/V

%6
4.8


Method of use



Pre-sowing
fertilization



Fertigation



pH(1% sol.) 7-9

Insoluble ≤ 0.1%

NEOFER 6.0, Fe-EDDHA bazlı özel formülasyonu sayesinde bitkiye hem hızlı hem de uzun süreli demir temini sağlayan bir üründür.

Formülasyonunda %4,8 orto-orto demir oranı ile optimum etki sunar:

- Orto-Orto Fraksiyonu (%4,8): 6 kimyasal bağ sayesinde demir iyonunu uzun süre kararlı ve çözünür halde tutar. Bu da kalıcı ve güçlü bir etkis sağlar.

NEOFER 6.0, tüm toprak tiplerinde kullanılabilir. Özellikle yüksek pH değerine ve aktif kireç fazlalığına sahip topraklarda etkili bir çözümdür.

KULLANIM DOZLARI

BİTKİ	KULLANIM ŞEKLİ / DÖNEMİ	TOPLAM DOZ
Narenciye	Hızlı büyüme dönemi İlkbahar gübrelemesi Sonbahar gübrelemesi	Ağaç başına 5-30g Ağaç başına 30-80g
Meyve Ağacı	Hızlı büyüme dönemi Vejetatif büyüme evresi (Trophophase)	Ağaç başına 5-20g Ağaç başına 20-50g
Asma	Tomurcuklar açılmadan önce Erken demir eksikliği belirtilerinde	Ağaç başına 3-5g Ağaç başına 5-25g

NEO COMBI MIX

EDTA Şelatlı İTHAL Combi

Garanti Edilen İçerik

	W/V
Demir (Fe)	4%
Mangan (Mn)	4%
Magnezyum (Mg)	3,3%
Bakır (Cu)	1,5%
Çinko (Zn)	1,5%
Bor (B)	0,5%
Molibden (Mo)	0,1%
Kobalt (Co)	0,05%


Method of use



Foliar fertilization



Fertigation



pH(1% sol.) 6±1.5

- **NEOCOMBI** Bitki gelişiminde kritik rol oynayan tüm mikro elementleri aynı anda sağlar.
- Bitkinin kök, gövde, yaprak, çiçek ve meyve gelişiminde dengeli beslenmesini sağlar.
- Demir, mangan ve magnezyum birlikte çalışarak klorofil sentezini ve fotosentez verimliliğini artırır. Bu da daha yeşil, sağlıklı ve güçlü bitkiler anlamına gelir.
- Bor, çinko ve bakırın kombinasyonu, polen canlılığını artırır, çiçek dökülmesini azaltır ve meyve tutum oranını yükseltir. Özellikle verim kaybını önlemek için çiçeklenme döneminde çok faydalıdır.
- Molibden ve kobalt, azot metabolizmasını düzenler, kök bölgesindeki yararlı bakterileri destekler. Bu sayede bitki azotu daha etkin kullanır, kökler güçlenir.
- Kombine mikro element desteği, bitkiyi kuraklık, tuzluluk, aşırı sıcak/soğuk ve hastalık gibi stres koşullarına karşı daha dayanıklı hale getirir.
- EDTA şelatı sayesinde, pH'ı yüksek veya kireçli topraklarda bile mikro elementler çözünür ve bitki tarafından alınabilir. Böylece toprak kaynaklı mikro besin noksanlıklarını önler.
- Denge sağlandığında meyve ve sebzelerde renk, aroma, sertlik ve depolama süresi iyileşir. Özellikle ihracata giden ürünlerde kaliteyi artırır.

KULLANIM AMACI VE DOZLARI

Ürün Grubu	Uygulama Zamanı	Yaprak Uygulaması Doz (kg/ha)	Toprak Uygulaması Doz (kg/ha)
 Meyveler Turunçgil, Elma, Üzüm	Erken büyüme veya çiçeklenme dönemi	100 gr/100 lt su	200-1000 g/da
 Sebzeler Domates, Patates, Ispanak Havuç, Soğan, Brokoli	Vejetatif büyüme döneminde Dikimde veya erken büyüme döneminde	100 gr/100 lt su	300-800 g/da

Mikro Besin	Meyveler	Amaç
Demir (Fe)	Turunçgiller, Üzüm, Elma, Mango	Demir eksikliğini (kloroz) düzeltir; meyve kalitesini iyileştirir.
Çinko (Zn)	Turunçgiller, Muz, Armut, Şeftali	Çiçeklenmeyi, meyve tutumunu ve büyümeyi teşvik eder.
Mangan (Mn)	Ananas, Avokado, Yaban Mersini	Fotosentezi artırır ve yaprakların sararmasını önler.
Bakır (Cu)	Elma, Kiraz, Meyveler (Çilekgiller)	Meyve gelişimini ve hastalık direncini destekler.
Kalsiyum (Ca)	Elma, Üzüm, Çilek	Acı çukur gibi bozuklukları önler ve sertliği artırır.
Magnezyum (Mg)	Portakal, Limon, Misket Limonu	Klorofil üretimini ve genel meyve sağlığını artırır.

Fertigen K

Sıvı Potasyum Çözeltisi

Garanti Edilen İçerik

Potasyum Oksit (K₂O)

PH

W/V

27%

6,9

Method of use



Foliar fertilization



Fertigation



Fertigen K, tamamen organik ve bitkisel maddelerden üretilmiş özel bir potasyum kaynağıdır. Özellikle sebzelerdeki küçük meyve gelişmesini ve kalite anormalliğini gidermek için geliştirilmiştir.

Fertigen K, seralarda, tarla sebzeciliğinde, meyve yetiştiriciliğinde ve kesme çiçekçilikte kullanılabilir. Bu ürünün üretiminde özel organik şelatlar ilave edildiği için, bitkilerde hem yapraktan hem de topraktan son derece hızlı alınabilmektedir.

Fertigen K, meyvelerin hasattan sonra depolama ömrünü uzatmaktadır.

Fertigen K, uygulandığı ürünlerde etkisini hızla gösterir; özellikle kalite faktörü üzerindeki olumlu etkisi, hasat sonrası ticari olarak da üreticilerimize katkı sağlamaktadır.

KULLANIM DOZLARI

ÜRÜN	UYGULAMA ZAMANI	YAPRAKTAN DOZ* (g/hl)	FERTİGASYON DOZU* (kg/dekar)
 Açık tarla sebze yetiştiriciliği (Domates, Biber, Patlıcan, Salatalık, Kavun, Karpuz Fasulye, Bezelye)	İlk meyvelerin görülmeye başladığı tarihten itibaren 10-15 gün ara ile 2-3 uygulama tavsiye edilir.	200-250 ml/da	1,5-2 lt/da
 Meyve Ağaçları (Bağ, Turunçgiller, Elma, Armut, Kiraz, Ceviz, Zeytin, Nar, Fındık, Kayısı, Şeftali, Kivi)	İlk meyvelerin görülmeye başladığı tarihten itibaren 10-15 gün ara ile 2-3 uygulama tavsiye edilir.	250-300 ml/100 lt su	1,5-2 lt/da
 Çilek	İlk meyvelerin görülmeye başladığı tarihten itibaren 10-15 gün ara ile 2-3 uygulama tavsiye edilir.	200-250 ml/da	1,5-2 lt/da
 Tarla Bitkileri (Pamuk, Buğday, Tütün, Pirinç, Soya, Ayçiçeği, Fıstık, Arpa, Mercimek, Şeker Pancarı, Patates, Soğan, Havuç, Turp)	Ekimden 25-30 gün sonra başlayıp Üretim periyodu boyunca 10-15 gün ara ile 2-3 uygulama tavsiye edilir.	200 ml/da	1,5-2 lt/da

Fertigen FRUIT

Meyve Rengi ve Sertliği için Üstün Performans

Garanti Edilen İçerik

	W/V
Toplam Azot	10%
Amonyum Azotu	1%
Nitrat Azotu	9%
Fosfor Pentaoksit (P ₂ O ₅)	8%
Potasyum Oksit (K ₂ O)	18%
Kalsiyum Oksit (CaO)	8%
Bor (B)	1%

Method of use



Foliar fertilization



Fertigation



Fertigen Fruit, özellikle meyve tutumu, gelişimi ve kalitesini artırmak amacıyla geliştirilmiş, dengeli ve güçlü bir toz gübredir. İçeriğinde bulunan azot, fosfor, potasyum, kalsiyum ve bor gibi temel besin elementleri sayesinde bitkinin hem vegetatif hem de generatif gelişimini destekler.

Yüksek oranda nitrat formunda azot, bitkiler tarafından hızlı bir şekilde alınarak büyümeyi teşvik ederken, fosfor kök gelişimini ve çiçeklenmeyi destekler. Formülasyonun öne çıkan bileşeni olan potasyum, meyve iriliği, renklenme ve tat gibi kalite kriterlerini doğrudan etkiler. Kalsiyum, meyve dokusunu güçlendirerek çatlama ve çürüklere karşı koruma sağlar; bor ise çiçeklenme kalitesini artırarak sağlıklı meyve oluşumunu destekler.

Fertigen Fruit, meyve ve sebze üretiminde yüksek verim hedefleyen üreticiler için ideal bir tercihtir. Uygulama sonrası bitkide daha güçlü gelişim, daha yüksek meyve tutumu ve raf ömrü uzun, kaliteli ürünler elde edilir.

KULLANIM DOZLARI

ÜRÜN	UYGULAMA ZAMANI	YAPRAKTAN DOZ* (g/hl)	FERTİGASYON DOZU* (kg/dekar)
 Tüm Sebzeler	Ekim-Dikimden 15-20 gün sonra başlayıp 10-15 gün ara ile 2-3 uygulama tavsiye edilir.	100-150 gr/da	1 kg/da
 Tüm Meyve Ağaçları	Çiçek sonrasında itibaren 10-15 gün ara ile 2-3 uygulama tavsiye edilir.	150-200 gr/da	1 kg/da
 Tarla Bitkileri (Pamuk, Buğday, Tütün, Pirinç, Soya, Ayçiçeği, Fıstık, Arpa, Mercimek, Şeker Pancarı, Patates, Soğan, Havuç, Turp)	Çiçek sonrasında itibaren 10-15 gün ara ile 2-3 uygulama tavsiye edilir.	200 gr/da	1,5-2 lt/da

Fertigen ZnB

Çiçek Sayısı ve Tutumu için Üstün Performans

Garanti Edilen İçerik

	W/V
Bor (B)	3%
Mangan (Mn)	8%
Çinko (Zn)	10%

Method of use



Foliar fertilization



Fertigation



Fertigen ZnB, bitkilerin gelişiminde hayati rol oynayan çinko, mangan ve bor elementlerini dengeli oranlarda içeren özel bir mikro besin çözeltilisidir. Özellikle çiçeklenme, döllenme ve meyve tutumu süreçlerinde etkin rol oynayan bu üçlü, bitkinin verim ve kalite potansiyelini en üst düzeye çıkarmayı hedefler.

İçeriğindeki çinko, bitkide hormon sentezini ve hücre bölünmesini destekleyerek güçlü bir gelişim sağlar. Mangan, klorofil oluşumu ve fotosentez için gereklidir; yaprakların daha sağlıklı ve yeşil kalmasına katkı sağlar. Bor ise çiçeklenme kalitesini artırır, polen canlılığını korur ve meyve tutumunu olumlu yönde etkiler.

Fertigen ZnB, özellikle mikro element eksikliklerinin sık görüldüğü bölgelerde veya hassas dönemlerde kullanıldığında; daha sağlıklı bitkiler, daha güçlü çiçeklenme ve daha kaliteli meyveler elde edilmesine yardımcı olur.

KULLANIM DOZLARI

ÜRÜN	UYGULAMA ZAMANI	YAPRAKTAN DOZ* (g/ha)	FERTİGASYON DOZU* (kg/dekar)
 Açık Tarla Tüm Sebzeler	Çiçek öncesi ve Çiçekten hemen sonra olmak üzere 2 uygulama tavsiye edilir.	100-150 gr/da	350-400 gr/da
 Sera Tüm Sebzeler	Çiçek öncesi ve Çiçekten hemen sonra olmak üzere 2 uygulama tavsiye edilir.	100-150 gr/da	350-400 gr/da
 Tüm Meyve Ağaçları ve Bağlarda	Çiçek öncesi, Çiçekten hemen sonra ve Hasat sonrası olmak üzere 3 uygulama tavsiye edilir.	100-150 gr/100 lt su	450-600 gr/da
 Kesme Çiçekçilik ve Çim Alanlarında	İhtiyaç duyulan durumlarda 10-15 gün ara ile 2-3 uygulama tavsiye edilir.	100-150 gr/100 lt su	350-400 gr/da

IDRON SERİSİ

Suda Çözünebilen Damlama Gübreleri

IDRON ürün yelpazesi; fide, fidan ve tüm özel beslenme gereksinimleri olan bitkilerin gübrelenmesine yönelik üretilen bir seridir.

K-Adriatica'nın kendi formülasyonlarını geliştirmeye yönelik devam eden çözüm araştırmaları, formülasyon işlemi sırasında eklenen, gelişmiş özelliklere ve etkinliğe sahip fertigasyon ürünleri sunan **MiX K** adı verilen özel bir element karışımı üretti.

MiX K ilavesi çözünürlüğü artırır, pH derecesini ve iletkenliği azaltır. Tüm bunlar, tortulaşma ve buna bağlı olarak damlama borusu tıkanması olmadan verimli gübrelemeye dönüşür.



ÜRÜN	İÇERİK							
	Toplam Azot	Nitrat Azotu	Amonyum Azotu	Üre Azotu	P2O5	K2O	MgO	CaO
IDRON 9-50-9 +2Mg +ME	9	1	8		50	9	2	
IDRON 18-18-18 +ME	18	9,5	8,5		18	18		
IDRON 10-5-23 +2Mg+8CaO +ME	10	10			5	23	2	8
IDRON 10-5-40 +2Mg +ME	10	7,8		2,2	5	40	2	

Kullanım yöntemi



Damla Sulama
Uygulaması

- IDRON ürün serisinin tamamı düşük pH'ya (<4) sahip ürünlerdir.
- %100'ü çözünebilen klor içermeyen gübrelerdir.
- Tüm bitkilerde ihtiyaç duyulan dönemlerde 3-5 kg/da dozunda kullanımı tavsiye edilir.



K-SOL SERİSİ

Suda Çözünebilen Damlama Gübreleri

K-SOL SERİSİ, üreticilerin hasat beklentilerini karşılamak amacıyla, bitki ihtiyaçlarına en uygun element kombinasyonlarıyla formüle edilmiş, suda çözünürlüğü yüksek ve geniş ürün yelpazesine sahip bir seridir.

Tüm mikro elementler tamamen şelatlı formda bulunur ve bu sayede mikro element eksikliğine bağlı oluşabilecek fizyolojik bozuklukların önlenmesine ve giderilmesine etkin şekilde katkı sağlar.



ÜRÜN	İÇERİK								
	Toplam Azot	Nitrat Azotu	Amonyum Azotu	Üre Azotu	P2O5	K2O	MgO	CaO	SO3
K-SOL 9-50-9 +ME	9		9		50	9			
K-SOL 20-20-20 +ME	20		3	17	20	20			
K-SOL 12-6-36 +7SO3 +ME	12		3,5	8,5	6	36			7
K-SOL 10-50-0 +5Mg +ME	10		10		50		5		

Kullanım yöntemi



Damla Sulama
Uygulaması

- K-SOL ürün serisinin tamamı düşük pH'ya (4,45-6,19) sahip ürünlerdir.
- %100 çözünmeye sahip klor içermeyen gübrelerdir.
- Tüm bitkilerde ihtiyaç duyulan dönemlerde 2,5-5 kg/da dozunda kullanımı tavsiye edilir.



N-GOOO SERİSİ

Yavaş Salımlı Taban Gübreleri

Method of use




Cover fertilization



Pre-sowing fertilization



Fertilizers for bush transplanting



N-GOOO SERİSİ ürünleri, dicyandiamide nitrifikasyon inhibitörü (DCD) ile formüle edilmiş, yavaş salımlı gübrelerdir. DCD sayesinde amonyak azotu, kil fraksiyonunda bulunan kolloidler tarafından yakalanır ve uygulamadan itibaren 60-90 günlük bir süre içinde nitrik formda kademeli olarak emilir.

Bu süre boyunca, atmosferdeki liç ve buharlaşmanın neden olduğu kayıpların azalmasıyla azot, kademeli olarak bitkiye sağlanır. En üst düzeyde besinsel ve çevresel sonuçlar elde etmek için, formülasyon işlemi sırasında DCD, mikrokristal fazda diğer ham maddelere (azot, fosfor, potasyum) eklenir ve daha sonra sıkıştırma işlemi yapılır.

N-GOOO SERİSİ ürünlerinin kullanımı aşağıdaki avantajları sunar:

- Geleneksel formülasyonlara kıyasla gübre kullanımında %20'ye varan azalma,
- Çevreye duyarlı alanlarda bile bitki döngüsünün tüm aşamalarında kullanım imkânı,
- Her granül içinde eşit olarak dağıtılan dicyandiamide nitrifikasyon inhibitörü (DCD) sayesinde kademeli azot alımı,
- Toprakta hızlı parçalanmaları nedeniyle granüllerde bulunan elementlerin hemen kullanılabilirliği.

ÜRÜN	İÇERİK								
	Toplam Azot	Amonyum Azotu	Üre Azotu	P2O5	K2O	MgO	CaO	SO3	DCD İnhibitör
N-GOOO 21 KRISTAL	20,6	20,6						58	0,53
N-GOOO 30	30	13,5	16,5					36	1
N-GOOO 12-28	12	5	7	28					0,30
N-GOOO 15-5-25	15	5	10	5	25			9	2,50
N-GOOO 14-6-16	14	9	5	6	16	2	2	31	0,35

- Tüm bitkilerde ihtiyaç duyulan dönemlerde 30-60 kg/da dozunda kullanımı tavsiye edilir.
- Doz seçimi çeşitli faktörlere bağlıdır ve gerektiğinde değiştirilebilir. Bitki ihtiyacına göre uygulamalar tekrar edilebilir.

MICROPHOS

Mikrogranül Taban Gübresi
8-33-10 + (2 MgO) + (9 SO₃) + (0,8 Zn) ME

Garanti Edilen İçerik	W/V
Toplam Azot	8%
Amonyum Azotu	8%
Fosfor Pentaoksit (P ₂ O ₅)	33%
Potasyum Oksit (K ₂ O)	10%
Magnezyum Oksit (MgO)	2%
Kükürt Trioksit (SO ₃)	9%
Çinko (Zn)	0,8%
Molibden (Mo)	0,002%



ÖZELLİKLER

MICROPHOS, etkili bir başlangıç etkisi sağlamak amacıyla ekim veya fide dikimi sırasında kullanılmak üzere tasarlanmış bir mikrogranül gübredir. Yüksek çözünürlük derecesi, mikrogranülün hızlı dağılmasını ve besin maddelerinin hızlı emilimini sağlar; bu da köklerde fitotoksiste riski olmadan gerçekleşir.

Dağılımı optimize etmek için, granülün farklı boyutları üzerinde çalışılmıştır:

Mikro granülometri (0.8 - 1.2 mm arası): Yaygın ekim yapılan tarla bitkileri ve sebze dikim makinelerinde kullanım için uygundur.

Lokalize gübreleme tekniği şu avantajları sağlar:

1. Gübre ile tohum arasında doğrudan temas
2. Özellikle fosforun toprakta bağlanması (retrogradasyon) gibi besin maddelerinin etkisiz hale gelme olgusunun büyük oranda azalması
3. Kök oluşumunun (rizogenez) belirgin şekilde artması

MICROPHOS K N-P-K 8-33-10 B.T.C. 0,002% Mo + 0,8% Zn + 2% MgO + 9% SO ₃			
GRANÜLLER	ÖZGÜN AĞIRLIK	KULLANIM ŞEKLİ	KULLANIM ŞEKLİ
0,8 - 1,2	0,90		

- Ekim öncesi dönemde 2,5-4 kg/da dozunda kullanımı tavsiye edilir.
- Doz seçimi çeşitli faktörlere bağlıdır ve gerektiğinde değiştirilebilir. Bitki ihtiyacına göre uygulamalar değişiklik gösterebilir.

BODUR ZEYTİN ve BADEM FİDANLARI



Zeytin - Arbequina



Zeytin - Arbosana



Zeytin - Lecciana



Zeytin - Coriana



Zeytin - Koroneiki



Zeytin - Oliana



Badem - Makako

ÖZELLİKLER

Bütün zeytin çeşitlerimiz yağlık olup, makineli hasat ve budamaya uygundur Aynı makineler ile Makako çeşidi bademleri de hasat edebilir ve budayabilirsiniz. Tüm dünyada baş gösteren işçilik problemi ve maliyetleri göz önünde bulundurulduğunda, bodur zeytin ve badem çeşitleri çok önemli bir avantaj sağlamaktadır.

Bodur çeşit tercih ettiğinizde sadece bir zeytin fidanı değil aynı zamanda yeni bir bahçe modeli ile tanışmış oluyorsunuz. Super High Density Model!

Bu modelde Neorev Tarım olarak uzman ekibimiz sizlere sürecin başından sonuna kadar destek olmaktadır. Karar aşamasından başlayarak sulama altyapısı, fidan tedariği, dikim şekli, dikimden sonraki ilaçlama-gübreleme-sulama düzeni gibi tüm alanlarda sizlere destek oluyoruz ve bu modeli beraber bahçenize adapte ediyoruz.



NEOREV TARIM GIDA İTHALAT İHRACAT VE SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

web: www.neorevturkey.com

e-mail: info@neorevtarim.com

İletişim: +90 539 311 3547 / +90 542 633 9921

Adres : Yeni Mah. 524.Sokak Salihoğlu Apt. No:4 A Kızıltepe/Mardin

GELECEK İÇİN KÖKLERİNİ BUL

